



ДК СЕФОР

Висока стійкість до ушкодження весняними приморозками

Середньоранній гібрид для ранніх строків сівби та екстремальних умов перезимівлі. Повільні темпи осіннього розвитку істотно розширюють тривалість посівного періоду в напрямку більш ранніх строків, а оптимальні параметри рослин (невеликий габітус) дають змогу більш ефективно і швидко використовувати запаси вологи в ґрунті та доступні елементи живлення.

Сортотип

класичний

Група Стиглості

середньоранній

рекомендації

✓ Рекомендовані зони вирощування: нестійкого та недостатнього зволоження.
✓ Рекомендований рівень азотного живлення: середній.
✓ Відношення до ґрунтів: придатний до вирощування на супіщаних, суглинкових, глинистих ґрунтах.
✓ Реакція гібриду на густоти: потребує оптимальних та підвищених густот.
✓ Календарний строк сівби: • ранній — 15 липня – 10 серпня, • оптимальний — 10–20 серпня, • пізній — 20 серпня – 5 вересня. (можливе зміщення строків сівби в бік більш ранніх на 5–15 днів)
✓ Рекомендована норма висіву: • ранні строки — 400–450 тис./га, • оптимальні строки — 450–500 тис./га, • пізні строки — 500–600 тис./га.
✓ Використання морфорегуляторів: за ранніх строків сівби — обов'язкове. У зонах із високими ризиками перезимівлі за всіх строків сівби бажане використання морфорегуляторів, як заходу підвищення зимостійкості.
✓ Терміни збирання: можливе тривале (до 10–15 діб) відтермінування.

Характеристики

- Тип гібриду: для традиційної технології вирощування з ранніми строками сівби
- Група стиглості: середньоранній
- Час цвітіння: ранній
- Зимостійкість: дуже висока
- Посухостійкість: висока
- Інтенсивність гілкування: висока
- Стійкість до фомозу: дуже висока
- Придатність до раннього висіву: найкраща
- Придатність до пізнього висіву: не бажана
- Висота рослин: 115–130 см